

Impacto de la formación en diagnóstico y tratamiento de desgarros perineales en la identificación y tratamiento correcto.

Pons N, Pereda A, Gómez C, Del Real G, Sarasa N, Ojeda F.
Servei de Ginecologia i Obstetricia. Hospital General de Granollers.
Universitat Internacional de Catalunya

OBJETIVO: Verificar que tras un programa de formación específica, aumenta la detección de los desgarros de alto grado perineales en el parto eutócico.

PACIENTES Y METODOLOGIA:

Durante el año 2010 se realizaron cuatro cursos teórico-prácticos de diagnóstico y tratamiento de desgarros de alto grado (III-IV Classif.), en el que participaron profesionales, tanto médicos como matronas, que atienden partos eutócicos, incluyendo los que estaban en periodo formativo. Hemos cuantificado los desgarros de alto grado en los años previos a la formación y en el año posterior a la misma.

RESULTADOS:

En la siguiente tabla se resumen los partos eutócicos atendidos en nuestro centro y los desgarros diagnosticados en cada periodo

PERÍODO	TOTAL de PARTOS	DESGARROS de ALTO GRADO	INCIDENCIA %
2009	1402	5	0,36
2010	1333	8	0.60
2011	1138	11	0.97

Comparando la incidencia de desgarros en los años 2009-10 con el año 2011 (postcurso) se observa que existe un aumento de la incidencia que no alcanza nivel de significación estadística ($\chi^2 = 3.8$, $p > 0.005$ ($p = 0.053$)). Se observa un incremento en la incidencia que entendemos relacionado con una mayor tasa de diagnóstico.

CONCLUSIONES:

La realización de formación específica en el diagnóstico y tratamiento de los desgarros perineales de alto grado, permite un diagnóstico más preciso de los mismos y su tratamiento correcto.

Seguimos verificando la incidencia de esta complicación en aras de que en un futuro obtengamos significación estadística.